Farancia abacura

La **serpiente del lodo** (***Farancia abacura***) es una especie de reptil inofensivo y semiacuático de la familia Colubridae y subfamilia Dipsadinae. Habita en el sureste de Estados Unidos.

Índice

Descripción
Hábitat y distribución
Ecología
Referencias
Enlaces externos

Descripción

La serpiente del barro suele crecer hasta una longitud total (incluida la cola) de 1 a 1,4 m (40 a 54 pulgadas),[1] aunque puede alcanzar una longitud récord de algo más de 2 m.[2]

El dorso de la serpiente del barro es de color negro brillante. La parte ventral es roja y negra, y el rojo se extiende por los lados para formar barras de color rosa rojizo.

La forma en la que se disponen las escamas de la cabeza es distintiva en el sentido de que sólo hay una escama internasal, no hay escama preocular, y una escama temporal anterior. Las escamas dorsales son lisas, y están dispuestas en 19 filas en el medio del cuerpo. Hay 168-208 escamas ventrales y 31-55 escalas subcaudales. La placa anal está dividida.

Hábitat y distribución

F. abacura habita en las orillas de arroyos y pantanos, entre la vegetación densa o bajo desechos del suelo. Es casi totalmente acuática y rara vez sale del agua, excepto para poner huevos, hibernar o durante la sequía para escapar de la sequía en su hábitat.[3] [4] La serpiente del barro se encuentra en el sudeste de los Estados Unidos, en los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Illinois, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia.[5]

Serpiente del lodo

Estado de conservación

Preocupación menor **(UICN 3.1)**

Taxonomía

Reino:	Animalia
Filo:	Chordata
Clase:	Reptilia
Orden:	Squamata
Suborden:	Serpentes
Familia:	Colubridae
Subfamilia:	Dipsadinae
Género:	*Farancia*
Especie:	***F. abacura*** Holbrook, 1836

Sinonimia

Helicops abacurus
Holbrook, 1836
Calopisma Abacurum
Duméril, Bibron, Duméril, 1854
Homolopsis crassa
Blyth, 1854

Ecología

La serpiente del barro es mayormente acuática y nocturna. Se alimenta principalmente de salamandras acuáticas gigantes de los géneros *Siren* y *Amphiuma*, pero también come otros anfibios.[6] Se sabe que utilizan sus colas afiladas y puntiagudas para pinchar a sus presas, lo que les ha valido el apodo de "serpiente con aguijón", aunque sus colas no contienen ningún aguijón.

La época de cría de *F. abacura* tiene lugar en primavera, principalmente en los meses de abril y mayo. Ocho semanas después del apareamiento, la hembra pone de 4 a 111[7] huevos en un nido excavado en la tierra húmeda, a veces en nidos de caimanes.[8] La hembra permanecerá con sus huevos hasta que eclosionen.[9] En otoño, normalmente en septiembre u octubre. Aunque no se han encontrado huevos sin eclosionar en invierno o en primavera, muchas serpientes del lodo jóvenes son vistas entrando en humedales en primavera, muy probablemente de puestas depositadas y eclosionadas al final del verano o el otoño anteriores. Se cree que las crías de serpiente del barro entran en los hábitats acuáticos en otoño o retrasan su entrada hasta la primavera, pero no se sabe si permanecen en un nido terrestre o se dispersan en los hábitats terrestres durante este tiempo.[10]

Referencias

1. Missouri Department of Conservation (2013). Western Mud Snake (http://mdc.mo.gov/discover-nature/field-guide/western-mud-snake) Archivado (https://web.archive.org/web/20110907010336/http://mdc.mo.gov/discover-nature/field-guide/western-mud-snake) el 7 de septiembre de 2011 en la Wayback Machine. MDC Online. Accessed May 18, 2013
2. The University of Georgia (2008). Mud Snake (http://naturalhistory.uga.edu/~gmnh/gawildlife/index.php?page=speciespages/species_page&key=fabacura) Archivado (https://web.archive.org/web/20110929013626/http://naturalhistory.uga.edu/~gmnh/gawildlife/index.php?page=speciespages%2Fspecies_page&key=fabacura) el 29 de septiembre de 2011 en la Wayback Machine. The University of Georgia: Museum of Natural History. Accessed April 23, 2011.
3. «Terrestrial movements of the Red-bellied Mudsnake (*Farancia abacura*) and Rainbow Snake (*F. erytrogramma*)» (https://web.archive.org/web/20180209062956/http://comp.uark.edu/~jwillson/publications/2013%20-%20HerpRev%20-%20Farancia.pdf). *Herpetological Review* **44**: 208-213. 2013. Archivado desde el original (http://comp.uark.edu/~jwillson/publications/2013%20-%20HerpRev%20-%20Farancia.pdf) el 9 de febrero de 2018. Consultado el 26 de febrero de 2020. Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
4. Willson JD, Winne CT, Dorcas ME, Gibbons JW (2006). «Post-drought responses of semi-aquatic snakes inhabiting an isolated wetland: insights on different strategies for persistence in a dynamic habitat» (https://web.archive.org/web/20170811142316/http://comp.uark.edu/~jwillson/publications/2006%20-%20Willson%20et%20al.%20-%20Wetlands%20-%20Ebay%20snake%20drought%20responses.pdf). *Wetlands* **26**: 1071-1078. doi:10.1672/0277-5212(2006)26[1071:prossi]2.0.co;2 (https://dx.doi.org/10.1672%2F0277-5212%282006%2926%5B1071%3Aprossi%5D2.0.co%3B2). Archivado desde el original (http://comp.uark.edu/~jwillson/publications/2006%20-%20Willson%20et%20al.%20-%20Wetlands%20-%20Ebay%20snake%20drought%20responses.pdf) el 11 de agosto de 2017. Consultado el 26 de febrero de 2020.
5. Willson JD (2006). Mud Snake (*Farancia abacura*) (http://www.uga.edu/srelherp/snakes/faraba.htm) Archivado (https://web.archive.org/web/20110902130033/http://www.uga.edu/srelherp/snakes/faraba.htm) el 2 de septiembre de 2011 en la Wayback Machine. Savannah River Ecology Laboratory. Accessed April 23, 2011.
6. «Habitat influences diet overlap in aquatic snake assemblages» (https://web.archive.org/web/20170808183745/http://comp.uark.edu/~jwillson/publications/2013%20-%20Durso%20et%20al.%20-%202013%20-%20JZL%20-%20diet%20overlap%20in%20aquatic%20snakes.pdf). *Journal of Zoology (London)* **291**: 185-193. 2013. doi:10.1111/jzo.12061 (https://dx.doi.org/10.1111%2Fjzo.12061). Archivado desde el original (http://comp.uark.edu/~jwillson/publications/2013%20-%20

Durso%20et%20al.%20-%202013%20-%20JZL%20-%20diet%20overlap%20in%20aquatic%20snakes.pdf) el 8 de agosto de 2017. Consultado el 26 de febrero de 2020. Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)

7. «A new clutch size record for the Mud Snake (*Farancia abacura*)». *Southeastern Naturalist* **9**: 177-178. 2010. doi:10.1656/058.009.0114 (https://dx.doi.org/10.1656%2F058.009.0114). Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
8. «Reproduction and behavior of western mud snakes (*Farancia abacura reinwardtii*) in American alligator nests». *Copeia* **1993**: 219-222. 1993. doi:10.2307/1446314 (https://dx.doi.org/10.2307%2F1446314). Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)
9. Goin CJ, Goin OB, Zug GR (1978). *Introduction to Herpetology, Third Edition*. San Francisco: W.H. Freeman. xi + 378 pp. ISBN 0-7167-0020-4 (http://worldcat.org/isbn/0-7167-0020-4). ("Parental Care", *Farancia abacura*, p. 121).
10. «Annual emergence of juvenile mud snakes (*Farancia abacura*) at aquatic habitats». *Copeia* **1988**: 243-245. 1988. doi:10.2307/1445944 (https://dx.doi.org/10.2307%2F1445944). Parámetro desconocido |vauthors= ignorado (ayuda)

- Illinois Natural History Survey: *Farancia abacura* (http://www.inhs.uiuc.edu/cbd/herpdist/species/fa_abacura.html)
- "Black Snakes": Identification and Ecology (http://edis.ifas.ufl.edu/uw251) - University of Florida fact sheet

Enlaces externos

Obtenido de «https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Farancia_abacura&oldid=125707777»

Esta página se editó por última vez el 2 may 2020 a las 14:00.

El texto está disponible bajo la Licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual 3.0; pueden aplicarse cláusulas adicionales. Al usar este sitio, usted acepta nuestros términos de uso y nuestra política de privacidad.
Wikipedia® es una marca registrada de la Fundación Wikimedia, Inc., una organización sin ánimo de lucro.